

CÔNG THỨC BÓN PHÂN CHO RAU ĂN LÁ

(Rau cải, mồng tơi, rau đay, rau dền, xà lách,..) – Dùng pb01

1. Ươm giống: Trộn giá thể với tỷ lệ **3:7** (3 trùn quế pb01:7 giá thể).
2. Dùng phân trùn quế Pb01 bón lót:
Sau khi xử lý đất xong, phối trộn với hỗn hợp đất với **400kg – 450kg/1.000m²**
3. Dịch trùn quế D01 phun trên lá.
 - Sau khi cây có 2 – 3 lá thật ta phun D01 tỷ lệ **1:500 phun trên lá**, 7 – 10 ngày phun 1 lần.
 - **Hoặc** ngâm phân trùn quế Pb01 theo tỷ lệ 1kg phân trùn quế cho 3 lít nước sau đó lọc lấy nước và đem tưới phân giun lên cây.
4. Thu hoạch: Nhổ cả cây hoặc dùng dao cắt cách gốc 7 – 10cm để cây tiếp tục ra nhánh mới, bón thêm phân trùn quế pb01 sau mỗi lần thu hoạch.
 - Sau khi thu hoạch rau xong, cày xới đất tơi và phơi 2 – 3 nắng, bổ sung **200 – 250kg** phân trùn quế pb01/1.000m² để tiếp tục trồng vụ sau, nên xen canh trồng nhiều loại rau trên 1 mảnh đất.
5. Chú ý:
 - *Không phun phân bón lá D01 vào lúc trời mưa, phun lúc sáng sớm hay chiều mát để cây hấp thu dinh dưỡng tối đa.*
 - *Phân pb01 dùng để thay thế hoàn toàn phân hữu cơ vi sinh.*

KÍNH CHÚC BÀ CON MÙA MÀNG BỘI THU!

-----o0o-----